

# **MENELAT<sup>®</sup> ODT**

**Comprimidos orodispersíveis  
– 15 mg, 30 mg e 45 mg**

**BULA PARA PACIENTE****Bula de acordo com a Resolução-RDC nº 47/2009****MENELAT® ODT**  
**mirtazapina****I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO****MENELAT® ODT**  
**mirtazapina****MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA****APRESENTAÇÕES**

Comprimidos orodispersíveis 15 mg: embalagens com 6 e 30 comprimidos.

Comprimidos orodispersíveis 30 mg: embalagens com 30 comprimidos.

Comprimidos orodispersíveis 45 mg: embalagens com 30 comprimidos.

**USO ORAL****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido orodispersível de MENELAT® ODT 15mg contém:

mirtazapina .....15mg

Excipientes q.s.p .....1 comprimido orodispersível

Excipientes: crospovidona, manitol, celulose microcristalina, aspartamo, flavorizante morango guaraná, flavorizante menta, sílica coloidal anidra, estearato de magnésio e água purificada.

Cada comprimido orodispersível de MENELAT® ODT 30mg contém:

mirtazapina .....30mg

Excipientes q.s.p .....1 comprimido orodispersível

Excipientes: crospovidona, manitol, celulose microcristalina, aspartamo, flavorizante morango, guaraná, flavorizante menta, sílica coloidal anidra, estearato de magnésio e água purificada.

Cada comprimido orodispersível de MENELAT® ODT 45mg contém:

mirtazapina .....45mg

Excipientes q.s.p .....1 comprimido orodispersível

Excipientes: crospovidona, manitol, celulose microcristalina, aspartamo, flavorizante morango, guaraná, flavorizante menta, sílica coloidal anidra, estearato de magnésio e água purificada.

**II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE****Leia cuidadosamente esta bula antes de iniciar o tratamento com esse medicamento**

- Guarde esta bula. Você pode precisar ler as informações novamente em outra ocasião.
- Se você tiver alguma dúvida, peça auxílio ao seu médico ou farmacêutico.
- Esse medicamento foi receitado para você e não deve ser fornecido a outras pessoas, pois pode ser prejudicial a elas, mesmo que os sintomas que elas apresentem sejam iguais aos seus.
- Se algum dos efeitos colaterais se tornar grave ou se você apresentar algum efeito colateral que não esteja mencionado nesta bula, informe seu médico ou farmacêutico.

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

MENELAT<sup>®</sup> ODT é um medicamento pertencente ao grupo dos antidepressivos. É indicado para tratar a doença depressão.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

A mirtazapina é uma substância que age no sistema nervoso central interferindo em outras substâncias responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos e melhorando os sintomas da depressão. A mirtazapina apresenta propriedades sedativas. Ela praticamente não apresenta atividade anticolinérgica e, em doses terapêuticas, praticamente não apresenta efeitos sobre o sistema cardiovascular. A ação de MENELAT<sup>®</sup> ODT inicia, em geral, após 1 a 2 semanas de tratamento. O tratamento com uma dose adequada deve resultar em uma resposta positiva dentro de 2 a 4 semanas.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento é contraindicado para uso por pessoa:**

- com alergia (hipersensível) à mirtazapina ou a qualquer outro componente de MENELAT<sup>®</sup> ODT. Nesse caso, informe ao seu médico antes de iniciar o tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT.
- que estiver usando ou usou recentemente (dentro das últimas duas semanas) medicamentos classificados como inibidores da monoamino oxidase (IMAOs).

### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Uso em crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade**

MENELAT<sup>®</sup> ODT normalmente não deve ser utilizado em crianças e adolescente menores de 18 anos de idade, uma vez que a eficácia não foi demonstrada em dois estudos clínicos de curto prazo e devido a questões de segurança (vide item **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**).

Você deve saber que pacientes menores de 18 anos têm aumento do risco de apresentar reações adversas tais como tentativa de suicídio, ideias suicidas e hostilidade (predominantemente agressão, comportamento hostil e ódio) quando tomam esse tipo de medicamento. Apesar disso, seu médico poderá recomendar MENELAT<sup>®</sup> ODT para pacientes menores de 18 anos por considerá-lo a melhor opção. Se seu médico receitou MENELAT<sup>®</sup> ODT para um paciente menor de 18 anos e você quiser discutir essa questão, volte à consulta. Você deve informar ao seu médico se algum dos sintomas mencionados acima aparecer ou piorar durante o tratamento de menores de 18 anos com MENELAT<sup>®</sup> ODT. Ainda não foi demonstrada a segurança de longo prazo dos efeitos referentes ao crescimento, maturação e desenvolvimento cognitivo e de comportamento do MENELAT<sup>®</sup> ODT nesse grupo etário.

#### **Ideias suicidas e piora da depressão**

Se estiver deprimido, você pode, algumas vezes, apresentar pensamentos de autoagressão ou suicidas. Estes podem ser aumentados ao iniciar o uso de antidepressivos pela primeira vez, pois esses medicamentos demoram algum tempo para agir, geralmente cerca de duas semanas, mas algumas vezes, mais tempo.

Você estará mais propenso a apresentá-los:

- Se já teve, previamente, ideias de suicídio ou de autoagressão.
- Se for um adulto jovem. Informações dos estudos clínicos mostraram um aumento do risco de comportamento suicida em adultos com menos de 25 anos de idade, com condições psiquiátricas que foram tratadas com um antidepressivo.
  - Se tiver ideias suicidas ou de autoagressão a qualquer momento, contate o seu médico ou vá a um hospital imediatamente.
- **Você pode achar que ajuda contar a um parente ou amigo próximo** que você está deprimido, e pedir a ele para ler esta bula. Você poderia pedir a eles para avisá-lo se acharem que sua depressão está piorando, ou se estiverem preocupados com alterações no seu comportamento.

Também se recomenda cautela com MENELAT<sup>®</sup> ODT:

- Se você tem, ou teve alguma vez, alguma das seguintes condições:
  - Informe ao seu médico sobre essas condições antes de iniciar o tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT, se já não o fez:
- **convulsões** (epilepsia). Se você apresentar convulsões ou se suas convulsões se tornarem mais frequentes, interrompa o uso de MENELAT<sup>®</sup> ODT e contate o seu médico imediatamente;
- **doenças do fígado**, incluindo icterícia. Se ocorrer icterícia, interrompa o uso de MENELAT<sup>®</sup> ODT e contate o seu médico imediatamente;
- **doenças dos rins**;
- **doenças do coração**, ou **pressão sanguínea baixa**;
- **esquizofrenia**. Se sintomas psicóticos, tais como ideias paranoides se tornarem mais frequentes ou graves, contate o seu médico imediatamente;
- **depressão maníaca** (períodos alternados de sensação de euforia/hiperatividade e humor deprimido). Se você começar a sentir-se eufórico ou hiperexcitado, interrompa o uso de MENELAT<sup>®</sup> ODT e contate o seu médico imediatamente;
- **diabetes** (você poderá necessitar de ajuste da sua dose de insulina ou outros medicamentos antidiabéticos);
- **doenças dos olhos**, tais como o aumento da pressão nos olhos (glaucoma);
- **dificuldade para urinar**, que pode ser causada por um aumento da próstata;
- **determinados tipos de doenças cardíacas** que podem alterar o seu ritmo cardíaco, um ataque cardíaco recente, insuficiência cardíaca ou se utiliza medicamentos que podem afetar o ritmo do seu coração.
- Se apresentar sinais de infecção, tais como febre elevada não explicável, dor de garganta e feridas na boca.
  - Interrompa o uso de MENELAT<sup>®</sup> ODT e contate o seu médico imediatamente para fazer exame de sangue. Em raros casos, esses sintomas podem ser sinais de distúrbios na produção de células sanguíneas na medula óssea. Embora raros, esses sintomas aparecem mais comumente após 4-6 semanas de tratamento.
- Se for uma pessoa idosa, você poderá ser mais sensível aos efeitos indesejáveis dos antidepressivos.

### **Gravidez e lactação**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Peça orientação do seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

A experiência limitada com a administração de MENELAT<sup>®</sup> ODT em mulheres grávidas não indica aumento do risco. No entanto, recomenda-se cautela ao usar o produto durante a gravidez.

Se você estiver tomando MENELAT<sup>®</sup> ODT e engravidar ou se pretende engravidar, pergunte ao seu médico se pode continuar o tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT. Se você utilizar MENELAT<sup>®</sup> ODT até o parto, ou logo antes do parto, seu bebê deve ser observado quanto à presença de possíveis efeitos adversos.

Pergunte ao seu médico se você pode amamentar enquanto estiver em tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT.

### **Informação importante sobre os componentes do MENELAT<sup>®</sup> ODT**

MENELAT<sup>®</sup> ODT comprimidos orodispersíveis contém aspartamo, uma fonte de fenilalanina, o que pode ser prejudicial para pacientes com fenilcetonúria.

**Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.**

### **Efeitos sobre a habilidade de dirigir e operar máquinas**

MENELAT<sup>®</sup> ODT pode afetar sua capacidade de concentração e manter-se alerta. Assegure-se que essas habilidades não foram afetadas antes de dirigir ou operar máquinas.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

### **Interações medicamentosas**

Informe seu médico ou farmacêutico se estiver tomando (ou se pretende tomar) algum dos medicamentos relacionados abaixo ou quaisquer outros medicamentos, mesmo aqueles obtidos sem receita.

**Não tome MENELAT<sup>®</sup> ODT em combinação com:**

- **Inibidores da monoamino oxidase (IMAO).** Não tome, também, MENELAT<sup>®</sup> ODT durante as duas semanas depois de ter interrompido o tratamento com os IMAO. Se você interromper o tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT, não tome medicamentos contendo IMAO durante as próximas duas semanas. Exemplos de IMAO são moclobemida, tranilcipromina (ambos são antidepressivos) e selegilina (usada para tratamento da doença de Parkinson).

**Tome cuidado quando tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT em combinação com:**

- **Antidepressivos, tais como inibidores seletivos da recaptção da serotonina (SSRIs), venlafaxina e L-triptofano ou triptanos** (usados para tratar enxaqueca), **tramadol** (analgésico potente), **linezolida** (antibiótico), **lítio** (usado para tratar algumas condições psiquiátricas), **azul de metileno** (usado para tratar níveis elevados de metemoglobina no sangue) e **preparações contendo erva de São João (*Hypericum perforatum*)** (medicamento fitoterápico para tratar depressão). Em casos muito raros, MENELAT<sup>®</sup> ODT isoladamente ou em combinação com esses medicamentos, pode causar a chamada síndrome da serotonina. Alguns dos sintomas dessa síndrome são: febre não explicável, suor excessivo, aumento da frequência cardíaca, diarreia, contrações musculares (incontroláveis), calafrios, reflexos hiperativos, inquietação, alterações do humor e falta de consciência. Se você apresentar a combinação desses sintomas, informe seu médico imediatamente.
- **Antidepressivo nefazodona.** Ela pode aumentar a quantidade de MENELAT<sup>®</sup> ODT no sangue. Informe seu médico se você estiver utilizando esse medicamento. Poderá ser necessário reduzir a dose de MENELAT<sup>®</sup> ODT, e quando o uso da nefazodona for interrompido, a dose de MENELAT<sup>®</sup> ODT deve ser aumentada novamente.
- **Medicamentos para ansiedade ou insônia**, tais como as benzodiazepinas;  
**Medicamentos para esquizofrenia**, tal como olanzapina;  
**Medicamentos para alergias**, tal como cetirizina;  
**Medicamentos para dor intensa**, tal como morfina.  
Em combinação com esses medicamentos, MENELAT<sup>®</sup> ODT pode aumentar a sonolência causada por eles.
- **Medicamentos para infecções;** medicamentos para infecções bacterianas (tal como eritromicina), infecções fúngicas (tal como cetoconazol) e medicamentos para AIDS/HIV (tais como os inibidores da protease-HIV) e **medicamentos para tratamento de úlcera do estômago** (tal como cimetidina).  
Em combinação com MENELAT<sup>®</sup> ODT, esses medicamentos podem aumentar a quantidade de MENELAT<sup>®</sup> ODT no seu sangue. Informe seu médico se você estiver usando esses medicamentos. Poderá ser necessário reduzir a dose de MENELAT<sup>®</sup> ODT ou quando esses medicamentos forem interrompidos, a dose de MENELAT<sup>®</sup> ODT deve ser aumentada novamente.
- **Medicamentos para epilepsia**, tais como a carbamazepina e a fenitoína;  
**Medicamentos para tuberculose**, tal como a rifampicina.  
Em combinação com MENELAT<sup>®</sup> ODT, esses medicamentos podem diminuir a quantidade de MENELAT<sup>®</sup> ODT no sangue. Informe seu médico se você estiver usando esses medicamentos. Poderá ser necessário aumentar a dose de MENELAT<sup>®</sup> ODT ou

quando esses medicamentos forem interrompidos, a dose de MENELAT<sup>®</sup> ODT deve ser reduzida novamente.

- **Medicamentos para prevenir a coagulação do sangue**, tal como a varfarina. MENELAT<sup>®</sup> ODT pode aumentar os efeitos da varfarina sobre o sangue. Informe seu médico se você estiver usando esse medicamento. No caso da combinação, é recomendado que seu médico monitore o seu sangue cuidadosamente.
- **Medicamentos que podem afetar seu ritmo cardíaco**, como alguns antibióticos e antipsicóticos.

#### **Usando MENELAT<sup>®</sup> ODT com alimentos e álcool**

Você pode apresentar tontura se ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT. Não tome nenhuma bebida alcoólica. Você pode tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT com ou sem alimentos.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Após aberto, use o medicamento imediatamente após a abertura da embalagem individual.**

**MENELAT<sup>®</sup> ODT 15 mg:** Os comprimidos de MENELAT<sup>®</sup> ODT 15 mg são brancos, redondos, gravados com '36' em um lado e 'A' no outro lado com uma borda circular em relevo.

**MENELAT<sup>®</sup> ODT 30 mg:** Os comprimidos de MENELAT<sup>®</sup> ODT 30 mg são brancos, redondos, gravados com '37' em um lado e 'A' no outro lado com uma borda circular em relevo.

**MENELAT<sup>®</sup> ODT 45 mg:** Os comprimidos de MENELAT<sup>®</sup> ODT 45 mg são brancos, redondos, gravados com '38' em um lado e 'A' no outro lado com uma borda circular em relevo.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Sempre tome MENELAT<sup>®</sup> ODT de acordo com a orientação do seu médico ou farmacêutico. Converse com seu médico ou farmacêutico, se você tiver alguma dúvida.

#### **Qual quantidade tomar**

A dose inicial usual é de 15 mg ou 30 mg por dia. Seu médico pode recomendar aumento da dose após alguns dias para uma quantidade que seja melhor para você (entre 15 e 45 mg por dia). A dose, geralmente, é a mesma para todas as idades. No entanto, se você for uma pessoa idosa ou se apresentar uma doença dos rins ou do fígado, seu médico poderá adaptar a dose.

#### Quando tomar MENELAT® ODT


- Tome MENELAT® ODT diariamente, sempre no mesmo horário. É melhor tomar MENELAT® ODT como uma dose única antes de deitar. Entretanto, seu médico pode sugerir que a dose seja dividida em duas administrações, uma pela manhã e outra à noite antes de deitar. A dose maior deve sempre ser tomada antes de deitar.

**Tome o comprimido orodispersível (que se desintegra na boca) da seguinte maneira:**

#### 1. Não quebre o comprimido orodispersível

Para impedir a quebra do comprimido orodispersível, não aperte o blíster onde cada comprimido é acondicionado individualmente (Figura A).


FIGURA A



#### 2. Blíster (cartela) picotado para destacar um comprimido

Cada blíster contém comprimidos acondicionados individualmente, separados por pequenas perfurações. Destaque um pedaço do blíster contendo um comprimido ao longo das linhas picotadas (Figura 1).

FIGURA 1



#### 3. Descole a lâmina

Descole cuidadosamente a folha laminada, iniciando no canto indicado pela seta (Figuras 2 e 3).

FIGURA 2




FIGURA 3

#### 4. Retire o comprimido orodispersível

Retire o comprimido orodispersível com as mãos secas e coloque sobre a língua (Figura 4).

FIGURA 4



O comprimido desintegrar-se-á rapidamente e pode ser engolido sem água.

#### Quando você pode começar a se sentir melhor

Geralmente, MENELAT<sup>®</sup> ODT começa a agir logo após uma ou duas semanas e, depois de 2 a 4 semanas, você começa a se sentir melhor.

É importante que, durante as primeiras semanas de tratamento, você converse com o seu médico sobre os efeitos de MENELAT<sup>®</sup> ODT:

- 2 a 4 semanas depois de iniciar o tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT, contate o seu médico para informar como esse medicamento está funcionando.

Se você ainda não estiver se sentindo melhor, seu médico poderá recomendar uma dose maior. Nesse caso, contate o seu médico novamente depois de mais 2 a 4 semanas.

Geralmente, você precisará tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT por 4 a 6 meses até que seus sintomas de depressão tenham desaparecido.

#### Se você parar de tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT

Somente pare de tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT após consultar o seu médico.

Se você interromper o tratamento precocemente, sua depressão pode reaparecer. Quando você estiver se sentindo melhor, informe ao seu médico. Ele decidirá quando o tratamento deve ser interrompido. Não interrompa o tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT subitamente, mesmo que sua depressão tenha melhorado. A interrupção repentina do tratamento com MENELAT<sup>®</sup> ODT pode causar mal-estar, tontura, ansiedade ou agitação e dor de cabeça. Esses sintomas podem

ser evitados com a diminuição gradativa da dose. Seu médico recomendará que você diminua a dose gradativamente.

Se você tiver qualquer dúvida sobre o uso desse medicamento, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se for previsto que você tome sua dose **uma vez ao dia**

- Se você esquecer de tomar a sua dose de MENELAT<sup>®</sup> ODT, não tome a dose esquecida. Simplesmente pule essa dose. Tome sua próxima dose no horário normal.

Se for previsto que você tome sua dose **duas vezes ao dia**

- Se você esquecer de tomar a dose da manhã, simplesmente tome a dose juntamente com a sua dose da noite.
- Se você esquecer de tomar a dose da noite, não tome a dose juntamente com a dose da manhã seguinte; simplesmente pule a dose esquecida e continue a tomar suas doses da manhã e da noite normalmente.
- Se você esquecer de tomar as duas doses, não tente compensar as doses esquecidas. Pule ambas as doses, e continue a tomar as doses do dia seguinte normalmente pela manhã e à noite.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Assim como todo medicamento, MENELAT<sup>®</sup> ODT pode causar reações indesejáveis, embora nem todas as pessoas as apresentem. Algumas reações podem ocorrer mais frequentemente que outras. As reações adversas possíveis para o MENELAT<sup>®</sup> ODT são relacionadas abaixo e podem ser divididas da seguinte forma:

- **Muito comuns:** afetam mais de 1 usuário em 10
- **Comuns:** afetam 1 a 10 usuários em 100
- **Incomuns:** afetam 1 a 10 usuários em 1.000
- **Raras:** afetam 1 a 10 usuários em 10.000
- **Não conhecidas:** não podem ser estimadas a partir dos dados disponíveis

### **Muito comuns:**

- Aumento do apetite e ganho de peso
- Sonolência
- Dor de cabeça
- Boca seca

### **Comuns:**

- Letargia (moleza no corpo)
- Tontura
- Agitação ou tremor
- Náusea
- Diarreia
- Vômitos

- Constipação
- Manchas vermelhas ou erupção na pele (exantema)
- Dor nas articulações (artralgia) ou nos músculos (mialgia)
- Dor nas costas
- Sensação de desmaio ou tontura quando você levanta subitamente (hipotensão ortostática)
- Inchaço (tipicamente nos tornozelos ou pés) causado por retenção de líquido (edema)
- Cansaço
- Sonhos nítidos
- Confusão
- Sensação ansiosa
- Problemas de sono
- Amnésia

**Incomuns:**

- Sensibilidade exacerbada ou emocionalmente “eufórico” (mania)
  - Pare de tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT e informe ao médico imediatamente.
- Sensação anormal na pele como, por exemplo, ardor, picadas, coceira, formigamento (parestesia)
- Pernas inquietas
- Desmaio (síncope)
- Sensações de insensibilidade na boca (hipoestesia oral)
- Pressão sanguínea baixa
- Pesadelos
- Sensação de agitação
- Alucinações
- Desejo de movimentar-se

**Raras:**

- Coloração amarelada dos olhos ou da pele; isso pode sugerir distúrbio na função do fígado (icterícia)
  - Pare de tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT e informe ao médico imediatamente.
- Contração ou espasmo muscular (mioclonia)
- Agressão
- Dor abdominal e náusea, que podem ser indicativos de inflamação no pâncreas (pancreatite)

**Não conhecidas:**

- Sinais de infecção, tais como febre elevada súbita não explicável, dor de garganta e feridas na boca (agranulocitose)
  - Pare de tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT e entre em contato com o médico imediatamente para fazer exame de sangue.

Em raros casos MENELAT<sup>®</sup> ODT pode causar distúrbios na produção de células sanguíneas (depressão da medula óssea). Algumas pessoas tornam-se menos resistentes a infecções porque MENELAT<sup>®</sup> ODT causa diminuição temporária de glóbulos brancos (granulocitopenia).

Em casos raros, MENELAT<sup>®</sup> ODT pode causar diminuição de glóbulos brancos e vermelhos, bem como de plaquetas (anemia aplástica), ou diminuição das plaquetas no sangue (trombocitopenia) ou um aumento no número de determinadas células brancas do sangue (eosinofilia).

- Crise epiléptica (convulsões)
  - Pare de tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT e informe ao médico imediatamente.
- Uma combinação de sintomas, tais como febre não explicável, suor excessivo, aumento da frequência cardíaca, diarreia, contrações musculares (incontroláveis), calafrios,

reflexos hiperativos, inquietação, alterações do humor, falta de consciência e aumento de salivação. Em casos muito raros, estes podem ser sinais de síndrome da serotonina.

- Pare de tomar MENELAT<sup>®</sup> ODT e informe ao médico imediatamente.
- Ideias de autoagressão ou ideias suicidas
  - Contate o seu médico e vá a um hospital imediatamente.
- Sensações anormais na boca (parestesia oral)
- Inchaço na boca (edema bucal)
- Inchaço no corpo (edema generalizado)
- Inchaço localizado
- Hiponatremia (baixo teor de sódio no sangue)
- Reações graves na pele (síndrome de Stevens-Johnson, dermatite bolhosa, eritema multiforme, necrólise epidérmica tóxica)
- Distúrbio de fala
- Aumento nos níveis sanguíneos de creatina quinase
- Dificuldade em urinar (retenção urinária)
- Dor, rigidez e/ou fraqueza muscular, escurecimento ou descoloração da urina (rabdomiólise)
- Aumento nos níveis do hormônio prolactina no sangue (hiperprolactinemia, incluindo sintomas tais como seios aumentados e/ou escorrimento de secreção semelhante a leite pelos mamilos)
- Sonambulismo
- Ereção dolorosa prolongada do pênis
- Reação medicamentosa com alterações em células do sangue (aumento dos eosinófilos) e sintomas gerais

#### **Eventos Adversos adicionais em crianças e adolescentes**

Em crianças com idade inferior a 18 anos os seguintes eventos adversos foram observados comumente em estudos clínicos: ganho de peso, urticária e aumento de triglicérides no sangue. Se alguma dessas reações adversas se tornar grave, ou se você notar qualquer reação adversa que não seja mencionada nesta bula, informe seu médico ou farmacêutico.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Se você ou alguém tomar mais MENELAT<sup>®</sup> ODT do que devia, procure um médico imediatamente. Os sinais mais comuns de superdose de MENELAT<sup>®</sup> ODT (na ausência de outros medicamentos ou álcool) são **tontura, desorientação e aumento do ritmo cardíaco**. Os sintomas de uma possível superdose podem incluir alterações no seu ritmo cardíaco (batimentos rápidos e irregulares), e/ou desmaios, que podem ser sintomas de uma condição ameaçadora de vida conhecida como *Torsade de Pointes*.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **III- DIZERES LEGAIS**

MS - 1.0525.0081

Farmacêutica Responsável: Dra. Ana Carolina P. Forti – CRF-SP nº 47.244

Fabricado por:  
Aurobindo Pharma Limited  
Hyderabad, Telangana State – Índia

Importado por:  
Torrent do Brasil Ltda.  
Av. Tamboré, 1180 - Módulos A3, A4, A5 e A6  
Barueri - SP  
CNPJ 33.078.528/0001-32

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA  
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**

**Esta bula foi aprovada em 10/02/2022.**

**SAC: 0800.7708818**



BU-04

**Anexo B**  
**Histórico de alteração para a bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
16/09/2022	Versão atual	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	-	-	-	-	- Onde como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? - Cuidados de armazenamento do medicamento	VP e VPS	15mg: com 6 e 30 comprimidos orodispersíveis 30 mg: com 30 comprimidos orodispersíveis 45mg: com 30 comprimidos orodispersíveis
12/05/2022	2716996/22-9	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	18/01/2022	229368/22-1	AE - Alteração - medicamentos e insumos farmacêuticos - importadora- endereço matriz	10/02/2022	- Dizeres legais	VP e VPS	15mg: com 6 e 30 comprimidos orodispersíveis 30 mg: com 30 comprimidos orodispersíveis 45mg: com 30 comprimidos orodispersíveis
30/04/2021	1656960/21-1	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	- Reações Adversas	VPS	15mg: com 6 e 30 comprimidos orodispersíveis 30 mg: com 30 comprimidos orodispersíveis 45mg: com 30 comprimidos orodispersíveis
15/09/2020	3137368/20-2	10450 - SIMILAR - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	- Quais os males que esse medicamento pode me causar? - Reações Adversas	VP e VPS	15mg: com 6 e 30 comprimidos orodispersíveis 30 mg: com 30 comprimidos

									orodispersíveis 45mg: com 30 comprimidos orodispersíveis
15/09/2020	3136066/20-1	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação a intercambialidade	15/10/2019	2494405/19-0	10490 - SIMILAR - Registro de Produto - CLONE	20/01/2020	Inclusão da frase de intercambialidade no bulário eletrônico da Anvisa.	VP e VPS	15mg: com 6 e 30 comprimidos orodispersíveis 30 mg: com 30 comprimidos orodispersíveis 45mg: com 30 comprimidos orodispersíveis
15/09/2020	3135850/20-1	Inclusão inicial de texto de bula – RDC 60/12	15/10/2019	2494405/19-0	10490 - SIMILAR - Registro de Produto - CLONE	20/01/2020	Inclusão de bula no bulário eletrônico da Anvisa.	VP e VPS	15mg: com 6 e 30 comprimidos orodispersíveis 30 mg: com 30 comprimidos orodispersíveis 45mg: com 30 comprimidos orodispersíveis